



## Anexo 1: fármacos para preparación de colonoscopia

<b>PEG con sulfatos</b>			
<b>Nombre comercial</b>	<b>Concentración iones (reconstituido)</b>	<b>Presentación</b>	<b>Reconstitución</b>
<b>Solución evacuante Bohm®</b> Ficha técnica: no recoge indicación en edad pediátrica	Sodio 128 mmol/l Potasio 9.98 mmol/l Cloruro 34.98 mmol/l Sulfato 39.66 mmol/l Carbonato 20 mmol/l Fosfato 4 mmol/l	Polvo para solución oral. Sobres de 17.50g (857.14mg de PEG 4000/g)	Reconstituir cada sobre en 250ml
<b>Casenglicol®</b> Ficha técnica: no recoge indicación en edad pediátrica	Sodio 128 mmol/l Potasio 10.58 mmol/l Cloruro 35.48 mmol/l Sulfato 78.85 mmol/l Carbonato 20 mmol/l Fosfato 4 mmol/l	Gel oral (34.29g de PEG 4000/100ml) Sobres y frascos de 175ml Sobres de 43.75 ml Botellas de 700 ml	Reconstituir cada sobre o frasco de 175 ml en 1 litro Reconstituir cada sobre de 43.75 ml en 250ml Reconstituir cada botella de 700 ml en 4 litros
		Polvo para solución oral (849.8mg de PEG/g) Sobres de 17.60g Sobres de 70.5g	Reconstituir cada sobre de 17.6g en 250ml Reconstituir cada sobre de 70.5g en 1 litro
<b>Klean Prep®</b> Ficha técnica: no recoge indicación en edad pediátrica	Sodio 125 mmol/l Potasio 10 mmol/l Cloruro 35 mmol/l Sulfato 40 mmol/l Carbonato 20 mmol/l	Polvo para solución oral (860mg de PEG 3350/g) Sobres de 68.57g	Reconstituir cada sobre de 68.57g en 1 litro
<b>PEG 3350 sin sulfatos</b>			
<b>Atolaxant®</b> Ficha técnica: no recoge indicación en < 12 años	Sodio 65 mmol/l Potasio 5 mmol/l Cloruro 53 mmol/l Carbonato 17 mmol/l	Polvo para solución oral (958mg PEG 3350/g) Sobres de 13.7g	Reconstituir cada sobre en 125ml
<b>Laxido orange®</b> Ficha técnica: no recoge indicación en < 12 años	Sodio 65 mmol/l Potasio 5.4 mmol/l Cloruro 53 mmol/l Carbonato 17 mmol/l	Polvo para solución oral (951mg de PEG 3350/g) Sobres de 13.8g	Reconstituir cada sobre en 125ml
<b>Molaxole®</b> Ficha técnica: no recoge indicación en < 12 años	Sodio 65 mmol/l Potasio 5.4 mmol/l Cloruro 53 mmol/l Carbonato 17 mmol/l	Polvo para solución oral (958mg de PEG 3350/g) Sobres de 13.7g	Reconstituir cada sobre en 125ml
<b>Movicol®</b> Ficha técnica: no recoge indicación en < 12 años	Sodio 65 mmol/l Potasio 5.4 mmol/l Cloruro 53 mmol/l Carbonato 17 mmol/l	Polvo para solución oral (951mg PEG 3350/g) Sobres de 13.8g	Reconstituir cada sobre en 125ml
		Solución oral 13.125g PEG/25ml	Reconstituir 25ml en 125ml

<b>Movicol pediátrico® (neutro y chocolate)</b> Ficha técnica: no recoge indicación en < 2 años	Sodio 65 mmol/l Potasio 5.4 mmol/l Cloruro 53 mmol/l Carbonato 17 mmol/l	Polvo para solución oral (951mg de PEG 3350/g) Sobres de 6,9g	Reconstituir cada sobre en 62.5ml
<b>PEG 3350 con ácido ascórbico</b>			
<b>Moviprep®</b> Ficha técnica: no recoge indicación en edad pediátrica	Sodio 181,6 mmol/l Potasio 14.2 mmol/l Cloruro 59.8 mmol/l Sulfato 52.8 mmol/l Ascorbato 29.8 mmol/l	Polvo para solución oral 100g de PEG 3350/sobre 4.7g ac ascórbico/sobre	1 sobre de PEG + 1 sobre con ac ascórbico se deben reconstituir en 1 litro

**PEG polietilenglicol**

<b>Picosulfato con citrato magnésico</b>		
<b>Nombre comercial</b>	<b>Presentación</b>	<b>Reconstitución</b>
<b>Citrafleet®</b> Ficha técnica: no recoge indicación en edad pediátrica	Polvo para solución oral 10mg picosulfato + 10g ac cítrico + 3.5g oxido magnesio /sobre	Reconstituir cada sobre en 150 ml
<b>Picoprep®</b> Ficha técnica: no recoge indicación en < 1 año	Polvo para solución oral 10mg picosulfato + 12g ac cítrico+ 3,5g oxido magnesio/sobre 2.5g picosulfato+3g ac cítrico+0.87g oxido magnesio/cucharada de 4g	Reconstituir cada sobre en 150 ml Reconstituir cada cucharada de 4g en 50 ml

<b>Bisacodilo</b>	
<b>Nombre comercial</b>	<b>Presentación</b>
<b>Dulco-laxo bisacodilo®</b> Ficha técnica: no recoge indicación en < 10 años	comprimidos 5 mg
<b>Dulco-laxo bisacodilo®</b> Ficha técnica: no recoge indicación en < 10 años	Supositorios 10 mg

<b>Senosidos</b>	
<b>Nombre comercial</b>	<b>Presentación</b>
<b>Puntalex®</b> Ficha técnica: no recoge indicación en < 6 años	Solución oral 150 mg/5 ml
<b>X-prep®</b> Ficha técnica: no recoge indicación en < 6 años	Solución oral 150 mg/75 ml
<b>Puntual®</b> Ficha técnica: no recoge indicación en < 6 años	Gotas. Frasco de 15 ml 30 mg/ml (20 gotas = 1 ml)
<b>Modane®</b> Ficha técnica: no recoge indicación en < 12 años	grageas 12 mg
<b>Pursenid®</b> Ficha técnica: no recoge indicación en < 12 años	grageas 12 mg
<b>Laxante salud®</b> Ficha técnica: no recoge indicación en < 12 años	comprimidos 7,5 mg

Fuente: Agencia Española del Medicamento (<https://www.aemps.gob.es>)